

Pré-test DPC « Acrosyndromes et capillaroscopie »

- 1) Parmi les situations suivantes présentant un phénomène de Raynaud, lesquelles ne nécessitent aucun bilan paraclinique ?
 - a. Prise de bêtabloquants.
 - b. Hypothyroïdie connue et traitée
 - c. Présence de tous les critères d'une maladie de Raynaud idiopathique
 - d. Lupus érythémateux systémique connu et traité
 - e. Aucune**

- 2) Quel est le bilan paraclinique minimum d'un phénomène de Raynaud ?
 - a. Aucun ne doit être systématique.
 - b. Echo-Doppler artériel des membres supérieurs.
 - c. Facteurs anti-nucléaires**
 - d. Cryoglobulinémie
 - e. Capillaroscopie**

- 3) Quelles sont les propositions vraies ?
 - a. Dans la population totale des phénomènes de Raynaud, la capillaroscopie ne sera que rarement pathologique mais reste indispensable au diagnostic précoce de la sclérodermie systémique.**
 - b. Un Raynaud apparaissant à 45 ans avec une capillaroscopie normale et des FAN positifs sans spécificité n'a aucun risque d'évoluer vers une sclérodermie systémique.
 - c. La présence de mégacapillaires à la capillaroscopie est par définition obligatoire pour retenir le diagnostic de sclérodermie systémique.
 - d. Une femme de 50 ans présente un Raynaud d'apparition récente. Les FAN sont négatifs. Il existe des hémorragies isolées à la capillaroscopie : celle-ci n'a donc pas besoin d'être refaite par la suite.
 - e. Les mégacapillaires peuvent s'observer dans la sclérodermie systémique mais également dans la dermatomyosite.**