

Evaluation

S. Vignes

Question n°1

Concernant le lymphœdème :

- A. L'augmentation de volume est surtout due à un excès de lymphe
- B. Les drainages lymphatiques sont l'élément le plus important du traitement
- C. Les anomalies veineuses sont fréquemment associées
- D. Le signe de Stemmer est l'impossibilité de plisser la peau du deuxième orteil (ou sa base)
- E. Les douleurs sont fréquentes

Réponse: D

Questions n°2

Le lipœdème :

- A. Est souvent confondu avec un lymphœdème
- B. Atteint initialement les mollets et les pieds
- C. Touche autant les hommes que les femmes
- D. Entraîne fréquemment des douleurs lors du pincement de la peau des membres inférieurs
- E. Se traite par le port de compression élastique

Réponse: A, D

Question n°3

La compression élastique utilisée dans le traitement du lymphœdème :

- A. Est basée sur les classes 3 ou 4
- B. Les chaussettes sont préférables aux bas cuisses
- C. La superposition est souvent indispensable pour les membres inférieurs
- D. N'est pas indispensable à la phase d'entretien
- E. Peut entraîner des douleurs aux plis de flexion

Réponse: A, C, E

Question n°4

Les bandages utilisés dans le traitement des lymphœdèmes sont :

- A. Sont habituellement bien tolérés cliniquement
- B. Faits avec des bandes élastiques (allongement > 100%)
- C. Ne peuvent pas être gardés plus de 24 heures
- D. Ne sont utiles que pendant la phase d'attaque
- E. Peuvent être faits par le patient lui-même

Réponses: A, E

Question n°5

Les érysipèles :

- A. Sont des complications rares des lymphœdèmes
- B. Se traitent avec des antibiotiques (amoxicilline, pristinamycine) associés à un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS)
- C. Peuvent toucher les membres supérieurs, parfois le sein
- D. Sont parfois récidivants
- E. Sont toujours secondaires à une porte d'entrée

Réponses: C, D