

Reponses QCM

QUESTION 1:

La fistule (FAV) native SOUHAITABLE est :

- 1) FAV radio céphalique au poignet
- 2) Fav de Breschia-Cimino
- 3) FAV huméro-céphalique
- 4) FAV huméro basilique

Bonne réponse 1 et 2

QUESTION 2:

Parmi ces FAV laquelle NECESSITE habituellement deux temps operatoires :

- 1) FAV radio céphalique au poignet
- 2) Fav cubito-basilique .
- 3) FAV huméro-céphalique
- 4) FAV huméro basilique

Bonne réponse : 4

QUESTION 3:

La variété anatomique ARTERIELLE la plus frequente au MB supérieurs est

- 1) Bifurcation haute de l'artère brachiale
- 2) Naissance isolée de l'artère interosseuse:
- 3) Duplication de l' artère brachiale .
- 4) Naissance haute de l'artère ulnaire

Bonne réponse : 1 et 3

QUESTION 4:

En cas de sténose veineuse centrale le ou les signes les plus fiables sont

- 1) La perte de modulation respiratoire du flux veineux
- 2) L'inversion du flux de la VIG
- 3) Mise en jeu de la collateralité sous clavière
- 4) circulation pré thoacique .
- 5) Circulation scapulaire .

Bonne réponse : 2

QUESTION 5:

FFBI C'EST :

- 1) Un montage de dialyse particulier
- 2) Le nom d'un néphrologue célèbre
- 3) Une recommandation de bonne pratique
- 4) un score de fonctionnement de FAV

Bonne réponse : 3

Question 6

Le risque d'ischémie distale induite par la création de FAV est :

- 1) Plus fréquent avec les FAV au poignet qu'au coude
- 2) Plus fréquent avec les KT
- 3) Prévisible par un index bras doigt $< 0,4$ avant la création
- 4) Plus précoce avec les pontage

Bonne réponse : 3 et 4

